

### Definition C.159 (Unbestimmtes Integral)

Eine Stammfunktion  $F$  von  $f$  wird auch als das *unbestimmte Integral* von  $f$  bezeichnet und man schreibt

$$F = \int f \quad \text{oder} \quad F(x) = \int f(x) dx.$$

Es ist jedoch nur bis auf eine additive Konstante bestimmt! (Vergleiche Satz C.156.)

#### Bemerkung:

Nicht jede integrierbare Funktion besitzt eine Stammfunktion und die Existenz einer Stammfunktion  $F$  von  $f$  sichert nicht die Integrierbarkeit von  $f$ .

### Bemerkung zur Substitutionsregel:

Es gibt prinzipiell zwei Möglichkeiten, diesen Satz anzuwenden:

- 1.) Der Integrand ist von der Form  $f(g(t))g'(t)$  oder läßt sich auf diese Form bringen. Zum Beispiel ist

$$\tan t = \frac{\sin t}{\cos t} = -f(g(t))g'(t)$$

mit  $f(x) = \frac{1}{x}$ ,  $g(t) = \cos t$ ,  $g'(t) = -\sin t$ .

- 2.) Zur Berechnung von  $\int f(x) dx$  substituieren wir  $x = g(t)$  mit einer geeigneten, umkehrbaren Funktion  $g(t)$ ; dann ist  $\frac{dx}{dt} = g'(t)$ ,  $dx = g'(t) dt$  und es entsteht das Integral

$$\int f(g(t)) \cdot g'(t) dt = H(t) + c,$$

wobei  $H$  eine Stammfunktion von  $h := f \circ g$  ist.

Unbekannte Integrale berechnet man durch (z.T. trickreiche) Umformungen in bekannte Integrale. Hierzu gibt es zwei Grundtechniken:

### Satz C.160 (Substitutionsregel)

Sei  $D \subset \mathbb{R}$ ,  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$  stetig,  $g : [a, b] \rightarrow D$  stetig differenzierbar. Dann gilt

$$\int_a^b f(g(t))g'(t) dt = \int_{g(a)}^{g(b)} f(x) dx.$$

### Satz C.161 (Partielle Integration)

Es seien  $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig differenzierbar. Dann gilt

$$\int_a^b f(x)g'(x) dx = f(x)g(x) \Big|_a^b - \int_a^b f'(x)g(x) dx.$$

### Bemerkung zur Substitutionsregel (Forts.):

Rücksubstitution  $t = g^{-1}(x)$  liefert

$$\int f(x) dx = H(g^{-1}(x)) + c.$$

Beispielsweise zur Berechnung von  $\int_0^a \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$  für  $0 < a < 1$  substituieren wir  $x := g(t) = \sin t$  (dann ist  $t = \arcsin x = g^{-1}(x)$ ),  $dx = \cos t dt$  und erhalten

$$\begin{aligned} \int_0^a \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx &= \int_0^a f(x) dx = \int_{g^{-1}(0)}^{g^{-1}(a)} f(g(t)) \cdot g'(t) dt \\ &= \int_0^{\arcsin a} \frac{1}{|\cos t|} \cos t dt \end{aligned}$$

(wegen  $0 \leq x < a < 1$  ist  $0 \leq t = \arcsin x < \frac{\pi}{2}$ , also  $\cos t \geq 0$  und somit)

$$= \int_0^{\arcsin a} 1 dt = \arcsin a.$$

